

8. *Pedinomma rufescens* Wetsw. var. *antennalis* Kieff. — Cette variété, nouvelle pour la France, a été trouvée sous une pierre basaltique enfoncée, et qu'on a été obligé de soulever au levier, à Agde (Hérault). C'est la localité habituelle d'un Coléoptère, l'*Anillus Mayeti* Ch.Bris.

9. *Lagynodes crassicornis* Kieff. — Nouveau pour notre pays, où l'on n'avait récolté jusqu'ici que le *L. pallidus* Boh.; trouvé en tamisant des feuilles mortes à St-Guilhem le Désert et à Castelnaud-le-Lez (Hérault).

10. *Plastomicrops acuticornis* Kieff. — Ce genre, qui n'a qu'une espèce européenne, était connu d'Italie. Nous l'avons également de St-Guilhem-le-Désert (Hérault).

11. *Rielia manticida* Kieff. — Les notes récentes de l'abbé KIEFFER⁽¹⁾ et de L. CHOPARD⁽²⁾ nous engagent à parler de cet insecte que nous avons eu souvent l'occasion d'observer à Montpellier. Il est très commun dans l'Hérault, fixé sous les ailes de *Mantis religiosa* L.; nous l'avons cherché vainement sur *Iris oratoria* L. Il ne nous est pas éclos des oothèques récoltées, mais nous avons observé que ceux portés par les Mantes adultes se comportent comme le décrit L. CHOPARD.

12. *Galesus numidianus* Kieff. var. *obscuripennis*, n. var. — Nous avons trouvé à Montpellier, en octobre, cette nouvelle variété, différant du type nord-africain par les ailes rembrunies et par le sillon dorsal qui atteint la moitié de la longueur de l'abdomen, tandis qu'il dépasse à peine le tiers de celui-ci chez le type.

13. *Lepidopria pedestris* Kieff. — Trouvé à Agde (Hérault), en décembre, est nouveau pour la France; signalé jusqu'ici d'Italie.

Description d'un *Haania* Sauss. [ORTH. MANTIDAE] du Laos

par L. CHOPARD.


Haania Vitalisi, n. sp. — *Type* : Un mâle provenant de Xieng-Khouang, province du Tranninh (R. VITALIS DE SALVAZA, 14-I-19).

♂. Tête assez petite, le front excavé, présentant de chaque côté, en avant des yeux, un grand lobe foliacé, à bords un peu dentelés. Occiput assez court, faiblement bombé, noirâtre, portant un assez gros

(1) KIEFFER, *Bull. Soc. ent. France*, [1919], p. 357.

(2) CHOPARD, 1920, *C. R. Ac. Sciences*, Paris, t. 170, p. 140.

tubercule conique près de chaque œil; deux ou trois autres très petits tubercules se trouvent en avant de celui-ci, suivant le bord de l'œil; enfin deux rangées de trois petits tubercules arrondis descendent vers le front, près de la ligne médiane; celle-ci est claire, très finement sillonnée. Lobes frontaux presque aussi longs que les yeux, à



Haania Vitalisi, n. sp.

Fig. 1. Tête, vue de dessus, $\times 7$; — fig. 2. Tête, thorax et patte antérieure, face latérale, $\times 5$; — fig. 3. Armure des fémur et tibia antérieurs, face interne, $\times 14$; — fig. 4. Tarse postérieur, $\times 14$.

bords denticulés, foliacés, face supérieure un peu concave, face inférieure présentant une carène médiane dentelée; milieu du front occupé par deux prolongements juxta-ocellaires aigus. Écusson frontal un peu plus haut que large, noirâtre, à bords latéraux s'arrondissant vers le haut et se terminant en un angle saillant. Clypéus court, caréné transversalement. Palpes à dernier article noirâtre, subaigu. Yeux gros, subtriangulaires, à sommet arrondi; ocelles très gros, ovalaires, les supérieurs à la base des épines frontales, latéralement, l'inférieur entre les deux épines, touchant presque les supérieurs. Antennes courtes, brunes, moniliformes, à 1^{er} et 2^e articles assez gros, plus clairs, 3^e grêle, plus long que les suivants; chacun des articles suivants porte quelques longs poils près de l'apex.

Pronotum assez long, à dilatation très marquée, ligne médiane présentant une carène irrégulièrement dentelée, bords denticulés; prozone relativement longue, séparée de la métazone par un sillon profond et relevée anguleusement par rapport à celle-ci. Mésonotum un peu plus long que large, terminé par deux pointes membraneuses triangulaires; métanotum plus long que le mésonotum, caréné longitudinalement.

Abdomen déprimé, les angles postérieurs de chaque tergite un peu saillants; sternites à bord postérieur anguleux et faiblement caréné au milieu. Plaque suranale assez courte, très largement arrondie mais brusquement terminée en une petite pointe. Plaque sous-génitale, grande, à apex légèrement échancré, portant deux styles rapprochés, courts, coniques. Cerques épais, n'atteignant pas l'apex de la plaque sous-génitale, de huit articles gros et courts, le dernier conique.

Hanches antérieures triquètres, à bords denticulés, dépassant un peu en arrière le bord postérieur du pronotum; lobes apicaux de la face interne contigus, le supérieur faiblement dilaté. Trochanters tuberculés en dessous, présentant à la face interne une tache noire, luisante. Fémurs longs et grêles, à bord supérieur sinué et denticulé, bords inférieurs garnis de petits tubercules dans leur partie basale, laquelle est à peu près égale à la partie apicale; face externe marbrée de brun et de jaunâtre, avec quelques petits tubercules sur la ligne médiane, face interne lisse, à grandes taches noirâtres, portant une très petite brosse près de l'apex; quatre épines discoïdales dont la 1^{re} et la 2^e subégales, la 3^e longue, la dernière plus courte, la 3^e étant insérée presque sur le bord interne, tout à fait en dehors de la ligne des trois autres; neuf épines internes: 1^{re} courte, 2^e longue, un peu courbée, 3^e courte, 4^e un peu moins longue que la 2^e, 5^e très courte, 6^e plus courte que la 4^e, un grand intervalle jusqu'à la brosse, 7^e très courte, 8^e très longue, épaisse, droite, 9^e apicale, petite; trois épines externes dans la première moitié de la partie apicale, dont la médiane plus courte que les deux autres. Tibias courts, comprimés, à bord supérieur un peu dentelé, apex épaissi, variés de jaunâtre et de brun; deux épines externes, dont une grande apicale, une plus courte vers le milieu; quatre épines internes: 1^{re} très courte, près de la base, 2^e épaisse et longue, un peu courbée, vers le tiers apical, 3^e à l'apex, assez forte, remontée à côté de l'ongle, 4^e un peu plus longue que la 3^e et au-dessus d'elle, presque rejetée sur le bord supérieur; griffe très forte, courbée, à surface finement striée. Tarses très longs, à métatarse dépassant l'ensemble des autres articles.

Hanches intermédiaires et postérieures à bord antéro-externe un peu élargi en lamelle; fémurs et tibias grêles, égaux, annelés de brun,